

- **Apothekers betrekken we systematisch in de evaluatie en bespreking van medicatiehistorieken.** Een medicatiebeoordeling betekent dat een apotheker in samenspraak met patiënt en arts de farmacotherapie van de patiënt evalueert, op basis van farmaceutische, medische en gebruiksinformatie. Voor oudere patiënten kan dit bijvoorbeeld volgens het STOPP & START principe^{vi}. Het doel van de medicatiebeoordeling is de optimalisatie van de bestaande farmacotherapeutische behandeling van een patiënt om verergering van aandoeningen of complicaties door farmacotherapeutische behandelingen of door aandoeningen zelf te voorkomen evenals het zelfmanagement van de patiënt te bevorderen. Apothekers registreren ook de al dan niet online verkoop van niet-werkzame of risicovolle geneesmiddelen (waarvan de terugbetaling geschrapt werd), zoals bv. de venotropen en sommige vitamines, hoestsiropen en afslankmiddelen. Ze informeren de patiënt verplicht hierover, als onderdeel van hun toegang tot afleveringshonoraria voor de basis farmaceutische zorg.
- De in het vorige regeerakkoord voorziene uitbreiding van de - tot nog toe beperkte, maar wel doeltreffende - **forfaitarisering van geneesmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten** wordt uitgevoerd. Het destijdse KCE-rapport is wat dat betreft nog brandend actueel. In analogie met vele andere landen kunnen de meeste geneesmiddelen op basis van DRG's (Diagnosis-Related Group) in overeenstemming met hun gebruik voor betrokken indicatie bij het merendeel van de opgenomen patiënten geforfaitariseerd worden met een minimum aan uitzonderingen (zoals vb. weesgeneesmiddelen). Nu is de situatie omgekeerd en wordt de lijst van buiten-forfait geneesmiddelen alsmaar groter. Dit zal in de ziekenhuizen de actuele incentive om meer niet-geforfaitariseerde geneesmiddelen voor te schrijven ook elimineren. De vrijgekomen middelen worden primair **geherinvesteerd in de ontwikkeling van klinische farmacie** (op de werkvloer!) in het ziekenhuis, gezien de bewezen impact van een klinisch apotheker op de kwaliteit en de patiëntveiligheid van geneesmiddelengebruik in de ziekenhuizen (start/stop, switch therapie, communicatie met de huisarts).